Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:56

Link do produktu: https://www.kozlik-golebie.pl/volantor-kmz-1-500ml-rozrod-i-rozruch-golebi-pocztowych-p-1839.html



Volantor - KMZ 1 - 500ml (rozród i rozruch gołębi pocztowych)

Cena	**89,90 zł**
Numer katalogowy	**2494**
Producent	**Volantor**

Opis produktu

Volantor - KMZ 1 - 500ml (rozród i rozruch gołębi pocztowych)

Volantor KMZ I jest mieszanką paszową uzupełniającą, która jest kompleksem naturalnych, ziołowych, mikroorganicznych, mineralnych i witaminowych składników. Jej zadaniem jest dostarczenie niezbędnych materiałów budulcowych i odżywczych w początkowych fazach rozwoju gołębia pocztowego.

Korzyści ze stosowania

- skutecznie zabezpiecza stawy i tkankę kostną
- dostarcza niezbędnych składników budulcowych młodemu organizmowi
- uzupełnia zawartość magnezu i kolagenu w diecie gołębi wyczynowych, zabezpieczając tkanki przed włóknieniem
- poprawia jakość wylęgu i wychowu młodych
- wspiera zdrowie i kondycję rodziców
- dostarcza odpowiednią ilość minerałów potrzebnych w pierwszych fazach rozwoju
- wzmacnia kondycję układu odpornościowego
- zabezpiecza rozruch gołębi wyczynowych po przerwie zimowej przed tzw. zwichnięciem skrzydła i przed spadkiem formy
- wspiera zdrowie ptaków w szczególnych okresach osłabienia, np. w okresie pierzenia

MPU o nazwie KMZ I działa wspierająco, wzmacniająco, regenerująco, odżywczo dla gołębi, które muszą zbudować i utrzymać szczytową formę we wszystkich początkowych okresach swojego rozwoju.

Skład

malina moroszka liść i owoc, wywary z zielonej herbaty, nasion konopii i ostropestu, ekstrakt z kurkumy, koncentrat owocowy, miód mniszkowy, przefermentowana melasa, bakterie mlekowe, kompleks mikro i makro pierwiastków: magnez, potas, żelazo, miedź, bor, selen, naturalny węglan ciężki wapnia ze skorupiaków, witaminy z grupy B, kolagen.

Stosowanie

Podawać dwa razy w tygodniu 5 ml/1 l wody lub 6-7 ml na 1 kg karmy, w poniższych okresach:

- w trakcie rozpłodu (I -IV)
- w okresie lęgowym (III-IV)
- w okresie przygotowawczym do lotów (III-IV)
- w okresie pierzenia (IX-XIII)

Informacje dodatkowe

- Preparat zawiera żywe mikroorganizmy, których nie należy łączyć ze środkami bójczymi, dezynfekcyjnymi, ani detergentami.
- Do rozcieńczania należy używać wody niechlorowanej, lub wodę odstawioną na 12 godzin w otwartym naczyniu.